

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/321997197>

# Control de la carga bacteriana en heridas crónicas: nuevos avances en apósitos antimicrobianos. [Control of bacterial load in chronic wounds: new advances in antimicrobial dressing...]

Poster · October 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.17141.47849

CITATIONS

0

READS

33

5 authors, including:



JM Rumbo-Prieto

Conselleria de Sanidade

148 PUBLICATIONS 52 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Luis Arantón Areosa

Servicio Gallego de Salud

100 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Javier Sánchez Gálvez

7 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:




Pressure Ulcers as adverse events: patient safety issues, knowledge, attitudes and perceived barriers by nurses in Spain (SECOACBA Project)  
[View project](#)



Implementation research [View project](#)

# Control de la carga bacteriana en heridas crónicas: Nuevos avances en apósitos antimicrobianos



**T**ejido no viable  
**I**nfección  
**M**(oisture) Exudado  
**E**stimulación de bordes



1b | Esta herida ha sido colonizada o infectada críticamente y la recuperación es lenta. Se necesitan agentes antimicrobianos y más desbridamiento



**Objetivo:** Conocer que apósitos antimicrobianos hay disponibles actualmente para el control de la carga bacteriana en heridas crónicas.

**Método:** estudio observacional descriptivo. Búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos (PubMed, Cuiden, Embase, Cinahl, Cochrane y JBI Connect +); así como, uso de metabuscadores (google scholar) y repositorios institucionales (Dialnet, Redalyc, SciELO) y de universidades (Rebuin). Periodo de estudio 2013-2017. Palabras clave: *apósito antimicrobiano, carga bacteriana y herida crónica (antimicrobial dressing, bacterial load, chronic wound)*. Selección y evaluación de contenidos por consenso del grupo nominal.

**Resultados:** actualmente, existen cuatro modalidades (tecnología) de apósitos antimicrobianos:

1- *Apósitos antimicrobianos:* plata iónica, plata nanocristalina, cadaxómero iodado y polihexamida biguanida (PHMB).

2- *Apósitos antimicrobianos combinados con varios colorantes antisépticos:* plata iónica con azul metileno y violeta genciana.


3- *Apósitos antisépticos combinados con péptidos antimicrobianos:* apósitos de miel (metilglioxol) con defensina-1; PHMB con biocelulosa (Acinobacter Xylinum).

4- *Apósitos con sustancias sintéticas hidrofóbicas:* cloruro de dialquilcarbamilo (DACC).

**Conclusiones:** Existen nuevos avances de apósitos antimicrobianos que son biocidas para la mayoría de microorganismos presentes en las heridas crónicas y, menos nocivos para el tratamiento de heridas. A falta de evidencias concluyentes, se presupone que dichos apósitos antimicrobianos cumplen con todos los estándares clínicos deseables: intervienen en el estado de colonización crítica de una herida, son de amplio espectro contra microorganismos, incluyendo los resistentes; de acción rápida, pero de actividad sostenida; no irritantes y no citotóxicos; fácilmente solubles; sin que presenten inactivación a fluidos orgánicos, exudado de heridas y biopelículas; y se consideran costo-efectivos.



Apósito de Ag+ iónica con hidrofibra



Apósito de Ag+ nanocristalina (15 nm).



Apósito de biocelulosa + PHMB



Apósito de alginato + PHMB 0,2%



Apósito polimérico + PHMB 0,2%



Apósito de acetato con cloruro de dialquilcarbamilo (DACC).



Apósito de espuma con plata iónica+ azul de metileno + violeta de genciana



Apósito de miel de Manuka (metilglioxol)

