



XUNTA
DE GALICIA

VIH
VHC

Proba rápida
no fluído oral
ANÓNIMA



Que é a proba rápida do VIH e do VHC no fluído oral?

Son probas que detectan a presenza de anticorpos fronte ao virus da inmunodeficiencia humana (VIH) e do virus da hepatite C (VHC). Estas probas rápidas fanse cunha mostra de fluído oral.

Como se fai?



1

Recóllese o fluído oral pasando suavemente a espátula do dispositivo de detección polas enxivas.

2

A espátula introdúcese a continuación nun frasco de líquido revelador.

Pasados 20 minutos o indicador que se atopa no mango do dispositivo informará se o resultado é reactivo ou non.



3

O indicador consta de dúas liñas (de cor avermellada), unha correspondente ao control do propio dispositivo de medida e outra correspondente ao resultado da mostra do paciente. É moi sinxela de facer e non causa ningunha molestia.

Todos os materiais utilizados son dun só uso e desbotables.

Que é o período ventá na infección polo VIH e VHC?



Os resultados da proba só son válidos se se realizan pasados tres meses da última práctica de risco.

Última práctica de risco

Mes 1

Mes 2

Mes 3


É o tempo que pasa desde que unha persoa se infecta co VIH ou o VHC ata que produce anticorpos contra estes virus.

Estes anticorpos son os que nos permiten detectar o VIH e o VHC nesta proba. Polo tanto, pode suceder que a proba non detecte os anticorpos nunha persoa recentemente infectada, porque aínda non deu tempo a que se formaron. Neste caso, e debido a este período ventá, o resultado desta proba sería un falso negativo, xa que a persoa si que está infectada e, ademais, pode transmitir estas infeccións.

A este espazo de tempo chámase período ventá e pode ser de ata 3 meses. Por esta razón só son definitivos os resultados de probas nas cales entre a última práctica de risco e a realización da proba transcorreran máis de 3 meses.

Mostra paciente

Control



Resultado non reactivo da proba:


O indicador da proba mostra unha liña (avermellada) despois de meter a espátula coa mostra do paciente no líquido revelador durante 20 minutos.

Esta liña, correspondente ao control, indica que o dispositivo funciona correctamente. Non obstante, a ausencia da segunda liña, correspondente á mostra do paciente indica que a proba non detecta anticorpos do VIH ou VHC na mostra de fluído oral analizada. Neste caso, o resultado non é reactivo, é dicir, que a persoa NON está infectada.

Só serán válidos os resultados nos cales pasaron máis de 3 meses entre a última práctica de risco e a realización da proba.

Mostra paciente

Control



Resultado reactivo da proba:

O indicador da proba mostra dúas liñas (avermelladas) despois de meter a espátula coa mostra do paciente no líquido revelador durante 20 minutos.

A primeira liña, correspondente ao control, indica que o dispositivo funciona correctamente. A segunda liña, correspondente á mostra do paciente, indica que a proba de VIH ou de VHC detecta anticorpos no fluído oral analizado.

Neste caso o resultado é reactivo, é dicir, que a persoa pode estar infectada co VIH ou o VHC. Polo tanto, débense realizar probas máis específicas de laboratorio para confirmar ou descartar estas infeccións. Mentres non se confirme ou descarte a infección reforzarse a práctica do sexo seguro, mediante a utilización do preservativo nas relacións sexuais anais, vexinais e buco-xenitais, para evitar reinfectarse ou infectar as parellas sexuais.

Por que e quen debe facer a proba rápida de VIH e de VHC no fluído oral?

Moitas persoas que están infectadas descoñecen que o están e por iso poden evolucionar a formas máis graves destas enfermidades e perder a oportunidade de recibir tratamento médico adecuado.


O diagnóstico e seguimento médico desde estadios iniciais mellorarían moito o seu pronóstico. Tamén poden transmitir, sen decatarse, o VIH ou o VHC ás súas parellas sexuais.

Estas probas son importantes para axudar a diagnosticar a estas persoas que descoñecen as súas infeccións.

Estas probas son especialmente recomendables en persoas que tiveron prácticas de risco como poden ser:

- Os homes que teñen relacións sexuais con homes (HSH) e que non usaron preservativo.
- As persoas heterosexuais que teñen múltiples parellas sexuais e non usaron preservativo.
- As persoas que exercen a prostitución e os seus clientes, e non usaron preservativo.
- As persoas que compartiron xiringas e outros materiais para inxectarse drogas.

Entidades comunitarias onde facer a proba rápida de VIH e VHC anónima e gratuíta



Dep. legal: C. 1927-2022

Obtén a lista de entidades tecleando esta ligazón no teu buscador de internet:

<https://www.sergas.es/Saude-publica/VIH-Entidades-probas-rapidas>

A realización da proba rápida no fluído oral é anónima e confidencial.

Unha proba rápida reactiva non é diagnóstica e polo tanto deberá ser confirmada por probas de laboratorio.

Recorda que tamén podes facer unha proba diagnóstica do VIH e/ou do VHC de laboratorio solicitándolla ao teu médico/a de cabeceira.

Podes pedir información sobre o VIH ou o VHC e os lugares onde facer a proba rápida en fluído oral no teléfono **881 542 914** de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas