

CALENDARIO de VACINACIÓN de ADULTOS

2017

	Ata 35 anos	36-49 anos	50-59 anos	60 ou máis anos
Td (tétano e difteria)	Completar ou iniciar pauta de vacinación (5 doses) Se ten calendario infantil completo: 1 dose de recordo ao redor dos 65 anos			
dTpa⁽¹⁾	Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32): 1 dose en cada embarazo			
Gripe	Se existe factor de risco: 1 dose anual			1 dose anual
Pneumocócica conxugada 13 v	Se existe factor de risco: 1 dose			1 dose ao cumprir 65 anos
Pneumocócica polisacáridos 23 v	Se existe factor de risco: 1 dose (intervalo mínimo 1 ano despois de Pn13)			1 dose aos 66 anos ⁽²⁾
Hepatite B	Se non foron vacinados previamente: 3 doses	Nados antes de 1982, se existe factor de risco: 3 doses		
Triple vírica⁽³⁾ (sarampelo, rubéola e parotidite)	Se non foron vacinados previamente e naceron despois de 1981: 2 doses Se non cumpren criterios de inmunidade e naceron entre 1968 e 1981: 1 dose			
Varicela⁽⁴⁾	Vacinação se non cumpren criterios de inmunidade: 2 doses			
Meningococo C	Se non foron vacinados previamente: 1 dose	Se existe factor de risco: 1 dose		
Virus do papiloma humano (VPH) mulleres	Non vacinadas previamente, nadas a partir 1994: 3 doses	Se existe factor de risco: 3 doses ⁽⁵⁾		

 Para todas as persoas desta categoría e das idades indicadas para as que non haxa constancia de inmunización/inmunidade
 Recomendada se existe outro factor de risco
 Non indicada

(1) **dTpa:** Persoal sanitario das áreas de obstetricia e pediatria: 1 dose

(2) **Pneumocócica de polisacáridos 23 v:** Persoas de 66 anos ou maiores desta idade non vacinadas con anterioridade

(3) **Triple vírica:** 2 doses para sanitarios, traballadores de centros educativos e viaxeiros a zonas de alto risco

(4) **Varicela:** segundo as fichas técnicas das vacinas fronte á varicela non existen datos de eficacia protectora nin de resposta inmune nas persoas seronegativas > 65 anos

(5) **VPH:** Mulleres sometidas a tratamento excisional de CIN2+ ou AIS nos 6 últimos meses: 3 doses

